

结核病检查指南

如出现咳嗽、咳痰、发热等疑似结核病症状且持续2周以上，及早接受检查并开始治疗，可以实现痊愈。

请按照以下指南前往附近医院接受结核病检查。



1 疑似结核病症状

如果以下症状持续2周以上，请警惕结核病并接受检查！



咳嗽持续2周以上



咳痰



发热



夜间盗汗



体重下降



胸部X线异常

2 结核病检查指南

通过简单的检查即可确认是否患有结核病。



症状咨询



前往医院



胸部X线检查



痰液检查
(必要时进行)

3 疑似病例生活守则



佩戴口罩



遵守咳嗽礼仪
(用衣袖遮住口鼻)



尽量避免前往
人员密集的
公共场所



经常通风



认真洗手

宿舍生活守则

出现症状时
立即告知宿舍管理员。



隔离及就医

务必在单独空间休息，
并及时就医。



4 根据检查结果的指南

如果未患结核病

请继续进行定期健康管理和症状监测。

如果症状持续，请再次接受检查。



如果被诊断为结核病

在规定的治疗期间内坚持接受治疗，
可以治愈。

请按照医务人员的指导认真接受治疗。



5 检查及诊疗费用指南



费用可能会根据是否适用健康保险以及医院规模而有所不同。
前往医院时，请务必佩戴口罩。