


结核病的定义




1 什么是结核病？

- 结核病是由结核分枝杆菌感染引起的呼吸道传染病。
结核病主要发生在肺部，但也可能累及身体其他部位。



2 结核病是如何传播的？

- 具有传染性的肺结核患者在咳嗽、打喷嚏或说话时，会将结核菌排放到空气中。
其他人吸入含有结核菌的空气后，可能会感染结核菌。



问答 (Q&A)

KOREA DISEASE CONTROL AND
PREVENTION AGENCY



Q1 结核病的治疗费用是多少？

A1 已加入健康保险者

在结核病治疗结束之前，治疗费用**全额免费**。
※ 但餐费及部分非医保项目等可能需要本人承担。

未加入健康保险者

结核病治疗费用原则上由**患者本人全额承担**，但可在**保健所或国立结核病医院***免费接受治疗。
※ 但餐费及部分非医保项目等可能需要本人承担。
※ 短期停留人员或无合法居留资格人员被诊断为耐多药结核病时，可在预算范围内获得治疗援助，直至不具传染性。

国立结核病医院信息

国立马山医院



215 Gapo-ro, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do

☎ 055-249-5051

国立木浦医院



75 Sinjimaetul 1-gil, Mokpo-si, Jeollanam-do

☎ 061-280-1114

Q2

我想回国接受结核病治疗。
离开韩国后，就不能再次入境韩国了吗？

A2

不是。回国后，如果继续接受结核病治疗，并能够确认已经完成治疗，则可以再次入境韩国。
※ 需通过韩国驻所在国家的大使馆（领事馆）提交完成治疗的相关证明材料。

Q3

如果擅自中断结核病治疗或不配合治疗，会怎么样？

A3

在韩国接受结核病治疗期间，如果出现“**不配合治疗**”或“**中断治疗**”的情况，将被**记录为重点管理对象**。
负责管理的保健所可采取**住院命令**等措施；如确认患者**已经出境**，可能会被采取**禁止入境措施**。
※ 负责管理的保健所可通过韩国疾病管理厅（或出入境管理事务所）查询出入境记录，以确认患者是否已经返回本国。
※ 如果能够确认患者已在本国完成结核病治疗，可解除禁止入境措施。需通过韩国驻所在国家的大使馆（领事馆）提交完成治疗的相关证明材料。

面向外国人结核病患者的

结核病

治疗管理指南



Tuberculosis

질병관리청

결핵 ZER

치가능한
결핵
Management of TB Patients

结核病筛查

KOREA DISEASE CONTROL AND PREVENTION AGENCY



1 结核病的主要症状有哪些？



咳嗽持续2周以上



体重下降



发热



夜间盗汗



全身乏力



食欲不振

2 疑似患有结核病时应该怎么办？

- 请前往附近的保健所或医疗机构接受结核病筛查。

结核病筛查费用

保健所




免费

医疗机构



由受检者本人承担

3 结核病筛查时需要接受哪些检查？



① 胸部X线检查

- 这是诊断结核病的基本检查。
- 如果检查结果显示“疑似结核病”，需要通过痰液检查进一步确认是否患有结核病。



② 痰液检查

- 采集痰液样本，检查其中是否存在结核菌。
- 如果被诊断为结核病，必须接受治疗。

结核病治疗

KOREA DISEASE CONTROL AND PREVENTION AGENCY



1 药物敏感性结核病的治疗

- 结核病通常只要坚持接受6个月以上的规范治疗，就可以治愈。

治疗过程中，即使症状有所好转，也不能擅自停药或停止前往医院就诊，否则可能导致疾病复发。

因此，在负责治疗的医务人员确认治疗已经完成之前，应持续接受治疗。

Isoniazid

Rifampicin

Ethambutol

Pyrazinamide

Tubis

- 药物敏感性结核病治疗的药品



传染性结核病患者感染管理守则

- 1 独自使用通风良好的独立房间。
- 2 咳嗽或打喷嚏时，请用纸巾遮住口鼻，并将使用过的纸巾丢入有盖的垃圾桶内。
- 3 外出就诊等情况下，必须佩戴口罩。

2 耐多药结核病的治疗

- 多药耐药结核病的治疗时间比药物敏感性结核病更长，通常需要6~20个月，治疗用药方案也更加复杂。

建议由具有丰富经验的专业医务人员进行治疗。

什么是耐多药结核病？

是指对结核病治疗中常用的两种强效抗结核药物——异烟肼和利福平产生耐药性的结核病。

为什么会发生耐多药结核病？

可能是由于一开始就感染了耐多药结核菌，也可能是由于患者未按照医嘱规律服药或过早停止治疗而导致的。

耐多药结核病专业医疗机构信息

