

တီဘီရောဂါ စစ်ဆေးမှု လမ်းညွှန်

၂ ပတ်ကျော်ကြာ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ သလိပ်ထွက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း စသည့် တီဘီ ရောဂါ သံသယလက္ခဏာများ ရှိပါက စေ့စီးစွာ စစ်ဆေးပြီး ကုသမှုစတင်ပါက အပြည့်အဝ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။

အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း အနီးဆုံးဆေးရုံတွင် တီဘီရောဂါ စစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။



1 တီဘီရောဂါ သံသယလက္ခဏာများ

အောက်ပါလက္ခဏာများ ၂ ပတ်ကျော် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါက တီဘီရောဂါကို သံသယရှိပြီး စစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။



၂ ပတ်ကျော် ချောင်းဆိုးခြင်း



သလိပ်ထွက်ခြင်း



ဖျားခြင်း



ညဘက် ချွေးထွက်ခြင်း



ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျခြင်း




ရင်ဘတ် X-ray ပုံမှန် မဟုတ်ခြင်း

2 တီဘီရောဂါ စစ်ဆေးမှု လမ်းညွှန်

ရိုးရှင်းသော စစ်ဆေးမှုများဖြင့် တီဘီရောဂါ ရှိ၊ မရှိကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။



လက္ခဏာများ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်း



ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ခြင်း



ရင်ဘတ် X-ray စစ်ဆေးခြင်း



သလိပ်စစ်ဆေးခြင်း (လိုအပ်ပါက)

3 စစ်ဆေးမှုခံယူရမည့်သူများအတွက် နေထိုင်မှုစည်းကမ်းများ



နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ပါ



ချောင်းဆိုးရာတွင် စည်းကမ်းလိုက်နာပါ (အကျိုးလက်ဖြင့် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းကို ဖုံးပါ)



လူများစွာ အသုံးပြုသည့် နေရာများသို့ သွားရောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ



မကြာခဏ လေဝင် လေထွက်ကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပါ



လက်ကို သေချာစွာ ဆေးကြောပါ

အဆောင်နေထိုင်မှု စည်းကမ်းများ

လက္ခဏာများ ပေါ်လာပါက အဆောင်ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ ချက်ချင်း အသိပေးပါ။



သီးခြားခွဲနေခြင်းနှင့် ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း သီးခြားနေရာတွင် အနားယူပြီးနောက် မဖြစ်မနေ ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။



4 စစ်ဆေးမှုရလဒ်အလိုက် လမ်းညွှန်ချက်

တီဘီရောဂါ မရှိပါက ကျန်းမာရေးကို ပုံမှန်စောင့်ရှောက်ပြီး လက္ခဏာများကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါ။

လက္ခဏာများ ဆက်လက်ရှိနေပါက ထပ်မံစစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။



တီဘီရောဂါဟု ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ခံရပါက

သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအတွင်း ကုသမှုကို အပြည့်အဝ ခံယူပါက ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ကုသမှုကို သေချာစွာ ခံယူပါ။



5 စစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးကုသမှု ကုန်ကျစရိတ် လမ်းညွှန်



ကျန်းမာရေးအာမခံ အကျုံးဝင်မှုနှင့် ဆေးရုံအမျိုးအစား၊ အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ ကုန်ကျစရိတ် ကွာခြားနိုင်ပါသည်။ ဆေးရုံသို့ သွားရောက်သည့်အခါ နှာခေါင်းစည်းကို မဖြစ်မနေ တပ်ဆင်ပါ။